

Belangrijke informatie voor patiënten onder biologische therapie

VACCINATIES

Volgende vaccinaties worden aanbevolen bij patiënten die een biologische therapie ontvangen:

WAT?	WANNEER?	BIJ WIE?
Griepvaccin	1x/jaar	Iedereen
Pneumokokken-vaccin	1x/ 5 jaar (eerste maal Apexxnar, nadien Pneumovax 23)	Iedereen
Tetanus	1x/ 10 jaar	Iedereen
Hepatitis A en B	Éénmalig 3 toedieningen (Twinrix, maand 0-1-6)	Iedereen
Zona/varicella ("windpokken")	Eenmalig 2 toedieningen (Shingrix, maand 0-2)	Patiënten die JAK-inhibitoren krijgen (Jyseleca®, Xeljanz®, Rinvoq®)

LEVENDE VACCINS

U mag **NOOIT** een levend vaccin zoals het gele koorts vaccin ontvangen tijdens een behandeling met een biologische therapie. Contacteer altijd vooraf uw behandelend arts indien u naar een risicogebied wenst te reizen.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Niet alle medicijnen kunnen veilig toegediend worden tijdens conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Informeer uw arts tijdig ivm een eventuele zwangerschap (swens).

Levende vaccinaties bij het jonge kind zoals Rotavirus mogen **NIET** worden toegediend gedurende het eerste levensjaar, wanneer de moeder een behandeling met biologische therapie kreeg tijdens de volledige zwangerschap.

ZONNEBESCHERMING

Goede zonnebescherming met factor 50 en jaarlijks huidnazicht is aangeraden bij therapie met Remsima® (infliximab) en Imuran® (azathioprine).

Contact

Mocht u verder nog vragen hebben of bepaalde aspecten van uw behandeling willen bespreken, aarzel niet om contact op te nemen.

IBD-verpleegkundigen

- mevr. Patsy Vlieghe
- mevr. Annelore Leploe

IBDverpleegkundige@stlucas.be

T 050 36 51 92

U kunt de IBD-verpleegkundigen dagelijks telefonisch bereiken. Dit in de voormiddag vanaf 8.00u. In de vakantieperiodes kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden.

Artsen

- prof. dr. J. Arts
- dr. J. Busschaert
- dr. S. Decock
- dr. A. Holvoet

U kunt de artsen bereiken via het secretariaat inwendige geneeskunde: T 050 36 51 55



algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
Ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge



az sint-lucas
BRUGGE

Biologische therapieën
bij ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa

Uw arts heeft u een behandeling met een biologisch geneesmiddel voorgesteld. Deze folder geeft u een overzicht van de verschillende biologische therapieën.

Voor het starten van de behandeling dient een eventueel aanwezige (latente) tuberculose uitgesloten te worden met een röntgenfoto van de longen en Mantoux test of Quantiferon test.

ANTI-TNF

ANTI-ADHESIE


ANTI-IL12/23

ANTI-JAKs


S1P MODULATOREN

WERKINGSMECHANISME


TNF is een ontstekingsbevorderende factor. Door het toedienen van specifieke antilichamen (ANTI-TNF) wordt het ontstekingsproces in de darmwand, dat mede de ziekte veroorzaakt, afgeremd.




Dit zijn antilichamen die selectief verhinderen dat witte bloedcellen vanuit de bloedvaten in het darmslijmvlies geraken. Minder witte bloedcellen in de darmwand heeft als gevolg minder ontsteking.




Dit zijn antilichamen die het teveel aan interleukine 12 en interleukine 23 blokkeren. Deze twee belangrijke ontstekingsbevorderende factoren worden aldus afgeremd.



Deze orale therapie blokkeert de werking van 1 of meerdere JAK-eiwitten. Hierdoor worden o.a. verschillende ontstekings-eiwitten (interleukines) geremd.






Deze therapie voorkomt dat afweercellen of lymfocyten, een soort witte bloedcellen, de dikke darm bereiken. Daardoor zal de ontsteking in de darm afnemen.





SNELHEID VAN WERKING EN TOEDIENINGSWIJZE

na dagen tot weken





na weken tot 3 maanden



⁽¹⁾ Enkel voor ziekte van Crohn

na dagen tot weken



na dagen tot weken

	OPLAAD-DOSIS	ONDERHOUDS-DOSIS
TOFACITINIB (Xeljanz®)	10mg 2/dag	5mg 2/dag
FILGOTINIB (Jyseleca®)	200mg 1/dag	200mg 1/dag
UPADACITINIB (Rinvoq®)	45mg 1/dag	30mg 1/dag of 15mg 1/dag

na weken tot maanden

	OPLAAD-DOSIS	ONDERHOUDS-DOSIS
OZANIMOD (Zeposia®)	DAG 1-4 0,23mg 1/dag	0,92mg 1/dag
	DAG 5-7 0,46mg 1/dag	

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Allergische reacties, gewrichtsklachten, droge huid, meer kans op infecties (verkoudheid, bronchitis, sinusitis, enz.)

In theorie maag-darminfecties (beperkte gegevens); verder quasi geen nevenwerkingen gezien darmselectiviteit.

Slechts beperkte gegevens beschikbaar: o.a. bovenste luchtweginfecties.

Infecties (vooral virale), stijging cholesterol, stijging CK, trombose bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren

(virale) infecties, gestoorde leverwaarden, verlaagde witte bloedcellen, vertraagd hartritme (bradycardie)