

Uw afspraak

- Datum:
- Na inschrijving via één van de kiosken in de centrale hal, meldt u zich aan in het **secretariaat radiologie** omuur (verdieping 2, route B 232).
- Uur onderzoek:

Beelden opvragen

Het opvragen van de beelden van uw onderzoek kan via de rubriek 'Mijn radiologiebeelden' van onze website www.stlucas.be.

Vul onderstaande gegevens in:

- referentienummer;
- geboortedatum (DDMMYYYY aan elkaar, zonder tekens).

Hiermee kan u enkel de beelden opvragen, voor het verslag wendt u zich tot uw behandelende arts. Let wel, de beelden zijn pas online beschikbaar na validatie van het onderzoek door de radioloog. Voor een MR-onderzoek kan dit tot 48u duren.

Alle beelden ouder dan één jaar werden gedeactiveerd. Om deze opnieuw online beschikbaar te maken, kan u contact opnemen met de dienst radiologie op T 050 36 53 85.

Dienst radiologie

Digitale radiologie
Echografie - doppler
CT-scan
MR-scan
Mammografie
Interventionele onderzoeken
Biopsie en drainages

Artsen

dr. Piet Dekimpe
dr. Thierry De Schrijver
dr. Alexander Favril
dr. Koen Geldof
dr. Hilde Goris
dr. Kristof Ramboer
dr. Pieter Vandaele - medisch diensthoofd
dr. Andries Van Holsbeeck
dr. Laurence Verhaeghe

Secretariaat

T 050 36 53 85
F 050 36 53 87
e-mail: secrx@stlucas.be



dirsec-folder (03/15)

MVD-MEDTECH-RX-FOLDER-ARTROGRAFIE (09/23)

az sint-lucas
BRUGGE

Artrografie

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be



Inleiding

Uw behandelende arts heeft een artrografie (+ CT of MR) voorgeschreven. Dit is een radiologisch onderzoek van een gewricht (heup, knie, enkel, schouder, elleboog of pols) waarbij door de radioloog een contrastmiddel (kleurstof) in het gewricht wordt gespoten om het beter zichtbaar te maken. Het onderzoek gebeurt met behulp van radiologische beelden (röntgenfoto's, CT-scan, MR-scan).

Zeer belangrijk

Voor het maken van een afspraak of indien u de afspraak niet kan nakomen, kan u steeds terecht op het secretariaat van de dienst radiologie op het nummer 050 36 53 85.

Vermeld hier steeds indien:

- u allergisch bent aan contrastmiddel, aardbeien, schaaldieren, tomaten, enz.;
- u lijdt van hooikoorts of astma;
- u allergisch bent aan verdovings- en ontsmettingsmiddelen, kleefpleisters, enz.;
- u (mogelijks) zwanger bent;
- u bloedverdunnende medicatie inneemt.

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn.

Als u een afwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, dan kan u dit vragen aan het secretariaat van de dienst radiologie.

Het onderzoek

De verpleegkundige begeleidt u naar het kleedhokje. Daarna wordt u de zaal binnen gelaten. Daar moet u met de rug op tafel gaan liggen en vervolgens zal de verpleegkundige een foto nemen van het gewricht. De radioloog die het onderzoek zal uitvoeren, wordt verwittigd van uw aanwezigheid.

Met behulp van röntgenbeelden wordt de plaats bepaald waar de radioloog in het gewricht gaat prikken. Deze plaats wordt ontsmet, waarna de radioloog prikt en contrastmiddel inspuit. Door het inspuiten van de vloeistof kan u tijdelijk een stijf of gespannen gevoel hebben in het gewricht. Soms vraagt de behandelende arts om medicatie (cortisonepreparaat) of een verdovingsmiddel in het gewricht te spuiten. Daarna wordt er opnieuw een röntgenfoto gemaakt.

Vaak wordt nadien ook een CT- of MR-onderzoek uitgevoerd (artro CT of MR) om meer informatie over de gewrichtsruimte te bekomen. De verpleegkundige zal u de nodige informatie geven zodat u zich naar de juiste wachtplaats kan begeven.

Een artrografie duurt ongeveer 10 minuten. De eventueel daaropvolgende CT-scan duurt zo'n 5 minuten, de MR-scan duurt zo'n 20 minuten. Alles samen moet u rekenen op een gemiddelde totale duur van 1 uur.

Na het onderzoek

Indien er geen andere onderzoeken meer nodig zijn, mag u de dienst verlaten. Het verslag wordt samen met de beelden doorgestuurd naar de aanvragende arts.

Na het onderzoek kan u soms wat pijn ondervinden in het gewricht. Indien nodig mag u een lichte pijnstiller innemen. De pijnstillers moeten aspirinevrij zijn (vb. Ibuprofen of Dafalgan). Ook neemt u best enkele uren rust. Probeer belasting van het gewricht de eerste uren te vermijden.