

OO
GU
ST

— oogartsen —

—
**OOGLID-
CORRECTIE.**
OPNIEUW OGEN
DIE SCHITTEREN.

— WAT HOUDT EEN CORRECTIE VAN HET BOVENOGLID IN?

De huid en het onderhuidse bindweefsel van een bovenooglid verliest met de jaren zijn elasticiteit. Zo ontstaat boven het oog een teveel aan huid. Vaak verslapt ook de huid op het voorhoofd en zakken de wenkbrauwen. Een ooglidcorrectie is het chirurgisch verwijderen van het teveel aan huid. Eventueel wordt ook overtollig vet verwijderd. Wat en hoeveel er verdwijnt, is per patiënt en per ooglid telkens verschillend. Soms gaat het vooral om huid, soms voornamelijk om vet.



Een frisse blik! Deze patiënt had matig last van huidteveel. Na een ooglidcorrectie stralen de ogen opnieuw en is oogmake-up opnieuw mogelijk.

WANNEER IS EEN OOGLIDCORRECTIE NODIG?

Huidteveel van het bovenste ooglid kan het zicht belemmeren of is esthetisch storend. Een ooglidcorrectie bezorgt je opnieuw een stralende blik.

EEN BOVENOGLIDCORRECTIE STAP VOOR STAP.

STAP 1 DE VOORBEREIDING

Met een viltstift wordt aangeduid welk deel van de huid verwijderd wordt. Na ontsmetting met Isobetadine dekken steriele doeken het oog af. Je gezicht blijft vrij. Injecties verdoven de huid plaatselijk. Is dit pijnlijk? Vergelijk het met een verdoving bij de tandarts. Na de verdoving is de operatie pijnloos. Enkel bij de neus kan de huid nog gevoelig zijn.



STAP 2 DE INGREEP

De huid van het bovenooglid wordt chirurgisch geopend, waarna het teveel aan huid met precisie verwijderd wordt.




STAP 3 DE HECHTING

Na de ingreep dicht een dunne doorlopende hechting de wonde waardoor littekens minimaal zijn.



STAP 4 NAAR HUIS

Een ooglidcorrectie duurt 45 minuten tot 1 uur. Nadien draag je 15 minuten een ijsbril en wordt een eerste controle uitgevoerd. Is alles in orde? Dan mag je meteen naar huis. Een verband is niet nodig. Wel zijn de oogleden de eerste week gezwollen en soms blauw. Die blauwe plekken kunnen zakken. Dat is normaal.



STAP 5 CONTROLE

Vijf tot zeven dagen na de ingreep verwijdert je oogarts de hechtingen tijdens een controlebezoek. Geleidelijk verdwijnt de zwelling. Na twee weken is die nog amper zichtbaar. Na twee maanden genezing ben je terug de oude, met ogen die stralen!



WORDT EEN BOVENOGLIDCORRECTIE TERUGBETAALD?

Ja. Tenminste als het bovenooglid het zicht belemmert. Een ooglidcorrectie om esthetische redenen wordt door het RIZIV niet vergoed.



WAT HOUDT EEN CORRECTIE VAN HET ONDEROGLID IN?

Heel wat mensen hebben bij het ouder worden last van wallen of hangende ogen. De reden? De huid verliest zijn elasticiteit en er ontstaat huidteveel in het onderooglid. Vaak verslapt ook het onderhuidse bindweefsel. Hierdoor puilt vet uit dat zich normaal in de oogkas bevindt. Dit creëert plaatselijke ooglidzwellung of wallen. Een correctie van het onderooglid is het chirurgisch verwijderen van het huidteveel en het overtollig onderliggend oogkasvet. Als ook het onderooglid zelf slap is, wordt deze aan de zijkant ingekort en opnieuw vastgemaakt. Wat en hoeveel er verdwijnt, is per patiënt en per ooglid telkens verschillend. Soms gaat het vooral om huid, soms voornamelijk om vet.



EEN ONDEROOGGLIDCORRECTIE STAP VOOR STAP.



STAP 1 DE VOORBEREIDING

Met een viltstift duidt de chirurg de plaats van de huidinsnede aan. Die bevindt zich net onder de wimpers, in de natuurlijke huidplooi. De zone wordt ontsmet met isobetadine en afgedekt met steriele doeken. Uw gezicht blijft evenwel vrij. Injecties verdoven de huid plaatselijk. Is dit pijnlijk? Vergelijk het met een verdoving bij de tandarts. Na de verdoving is de operatie pijnloos. Bij het weghalen van vet kan dit wat gevoelig zijn.



STAP 2 DE INGREEP

Je chirurg verwijdert het vet met precisie. Daarna verdwijnt het huidteveel. Tijdens de operatie wordt je geregeld gevraagd om naar boven te kijken en de mond te sperren. Zo heeft de chirurg het beste zicht op het te verwijderen huidteveel. Indien nodig wordt het ooglid horizontaal ingekort en vastgemaakt met hechtingen.



STAP 3 DE HECHTING

Een dunne doorlopende hechting in de natuurlijke huidlijnen van het ooglid zorgt voor een vrijwel onzichtbaar litteken.

STAP 4 NAAR HUIS

Een onderooglidcorrectie duurt 1 tot 1,5 uur. Na de ingreep draag je 15 minuten een ijsbril. Is alles in orde? Dan mag je meteen naar huis. Een verband is niet nodig. Wel zijn de oogleden de eerste week gezwollen en soms blauw. Die blauwe plekken kunnen zakken. Dat is normaal.

STAP 5 CONTROLE

Vijf tot zeven dagen na de ingreep verwijdert je oogarts de hechtingen tijdens een controlebezoek. Geleidelijk verdwijnt de zwelling. Na twee weken is die nog amper zichtbaar. Na twee maanden genezing ben je terug de oude, maar zonder wallen of hangende ogen!



— WORDT EEN ONDEROOGLEIDCORRECTIE TERUGBETAALD?

Neen. Het RIZIV beschouwt een onderooglidcorrectie als een esthetische ingreep. Die worden niet terugbetaald. Ook niet als een ziekte het huidteveel veroorzaakt, zoals de oogziekte van Graves.

— WAAR MOET IK REKENING MEE HOUDEN?

We willen je als patiënt zo goed mogelijk informeren. Daarom beschrijven we ook in detail eventuele bijwerkingen. Toch hoeft je je geen zorgen te maken: er treden zelden problemen op. Vrijwel alle patiënten zijn achteraf zeer tevreden met het resultaat.

Aspirines en bloedverdunders

Aspirines, pijnstillers, ontstekingsremmers en andere bloedverduunnende medicijnen in combinatie met een ooglidcorrectie zijn geen goed idee. Als je dergelijke geneesmiddelen neemt, moet je dit ruim voor de ingreep stoppen. Paracetamol kan wel.

Littekens

Littekens zijn niet enkel afhankelijk van de operatie-techniek, ook de reactie van de huid op de operatie heeft een invloed. Genezen wonden bij jou in het algemeen mooi? Dan is de kans op een mooi litteken groter. Stoppen met roken is sowieso bevorderlijk. Littekens vragen geduld: pas na een jaar is het eindresultaat zichtbaar. Bij een ooglidcorrectie wordt het litteken zoveel mogelijk in de huidplooi van het ooglid geplaatst, zodat het zo weinig mogelijk zichtbaar is.

Zwelling en ongevoeligheid

Na een ooglidcorrectie zwelt het ooglid. Dit verdwijnt geleidelijk, maar kan enige maanden duren. Hetzelfde geldt voor de gevoeligheid van het ooglid. Het gevoel herstelt zich na tijd.

Cysten

Nabij de hechting kunnen zich kleine gele bobbeltjes (inclusiecysten) ontwikkelen. Meestal verdwijnen die spontaan.

Kleurverschil van de huid

De huidskleur van het bovenooglid gaat van licht naar donker. Na een ooglidcorrectie wordt dit kleurverschil boven en onder het litteken soms zichtbaar. Ook verwijding van de bloedvaten in het ooglid kan na de operatie. Hierdoor is het bovenlid tijdelijk roder. Dit is vooral te merken bij mensen met een dunne huid en lichte huidskleur.

Irritatie van het oog

Het sluiten van de ogen kan de eerste maanden moeilijker zijn. Bij patiënten met een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie kan geringe uitdroging van het hoornvlies optreden. Dat voelt als zand in de ogen. Het is een zeldzame, maar hinderlijke complicatie. Een kant-en-klare oplossing bestaat niet. De behandeling bestaat uit kunsttranen.

Verskillende hoogte van bovenoogleden

Ook na zorgvuldige operaties kan er een verschil in hoogte zijn tussen het linkse en rechtse ooglid. Enige asymmetrie is overigens perfect natuurlijk, zowel voor als na een correctie.

Een uitpuilend oog door een nabloeding

Een bloeding in de oogkas waardoor het oog uitpuilt, is een zeer ernstige, maar gelukkig zeer uitzonderlijke complicatie. Een bloeding kan op de oogzenuw drukken en daarmee blindheid veroorzaken. Meld je direct in het ziekenhuis. In onze praktijk is deze complicatie nog nooit voorgekomen.

VRAGEN?

Heb je extra vragen of overweeg je een ooglidcorrectie? Vraag je oogarts om raad. Contacteer ons en vermeld bij het maken van de afspraak de interesse in een van deze ingrepen.

info@oogust.be
www.oogust.be
T 050 36 53 00
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

