

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Je therapie met nal-irinotecan en 5FU

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): nanoliposomaal irinotecan en 5FU. De therapie bevat ook leucovorin. Dat is zelf geen cytostaticum, maar zorgt ervoor dat 5FU beter werkt.

Daarnaast kunnen we nog enkele andere geneesmiddelen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt twee weken (14 dagen) en omvat één opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe twee weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dagen/momenten					Wijze van toediening
		1	2	3	4	5-14	
Nanoliposomaal irinotecan	Onivyde®	•					Infuus over 90 minuten
Leucovorin	Elvorine®	•					Infuus over 30 minuten
5FU	Fluorouracil®	•	•	//			Infuus over 46 uur
Ondersteunende medicatie tegen misselijkheid							
	Acidexam® 10 mg	•					Inspuiting
	Zofran® 8 mg	•					Inspuiting
	Medrol® 32 mg		•	•	•		1 tablet via de mond
	Emend®	125 mg	80 mg	80 mg			1 capsule via de mond

Waar wordt de therapie toegediend?

De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis Oncologie. Overnachting is dan niet nodig.

Je komt op dag 1 naar het ziekenhuis, waar je nanoliposomaal irinotecan gedurende 90 minuten en leucovorin gedurende 30 minuten krijgt toegediend. Nadien krijg je 5FU gedurende 46 uur toegediend via een Infusor®-pompje waarmee je naar huis kunt gaan. Dit pompje werkt 46 uur lang.

Op dag 3 komt de thuisverpleegkundige het Infusor®-pompje afschakelen.

Aandachtspunten bij nanoliposomaal irinotecan - 5FU

- Als je 5FU via een Infusor®-pomp krijgt, is het belangrijk dat je **voldoende drinkt** (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens de toediening.
- Tijdens de behandeling eet of drink je **geen pompelmoes(sap), sterfruit of bloedsinaasappels** en gebruik je geen preparaten op basis van **sint-janskruid** (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van A. Vogel).

Nevenwerkingen voorkomen (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen:

- Voorkom infecties
- Voorkom wondjes
- Drink voldoende
- Zorg voor een goede mondhygiëne en mondspoeling
- Zorg voor voldoende rust en beweging
- Zorg voor een goede huidverzorging
- Neem de voorgeschreven medicatie in
- Voorzie een alternatief (pruik, sjaaltje ...)

Mogelijke nevenwerkingen

- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (bijvoorbeeld aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop of diarree
- Haarverdunning, mogelijk haarverlies